

Decizia 2/2CN/2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

Decizia 2/2CN/2019 din 2019.04.10

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 10 aprilie 2019

Intră în vigoare:

10 aprilie 2019

Decizia 2/2CN/2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

Data act: 19-ian-2019

Emitent: Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

În temeiul art. 510 și 512 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie:

Art. I

- Anexa la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

****_

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,

Ecaterina Ionescu

ANEXĂ: CONȚINUTUL MINIM al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

(- Anexa la Decizia nr. 10/2007)

A. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometre electronic cu măsurare la încheietura mâinii	1 buc.
2.	Fese 10 x 10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5 x 5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE) sau clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml/10 ml sterile	5 buc.

B. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerină (NITROGLICERINA)	Cpr. 0,5 mg	1 cutie (20 cpr.) Atenție la valabilitate (6 luni)!	Se administrează 1 comprimat sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TA _s > 100 mg Hg; se poate repeta administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 comprimate).
	sau Nitroglicerină (MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT)	sau Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10 g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criza de angină pectorală, infarct

				miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs > 100 mg Hg; se poate repeta la 5 min.
2.	Nifedipină (ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 comprimat sublingual, pentru reducerea TA.
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINA)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează 1/2 comprimat mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut.
4.	Enalapril (ENAP)	Cpr. 25 mg	10 buc.	Se administrează 1 comprimat sublingual pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 comprimat.
5.	Adrenalină 1:1000 sau	fiole 1 mg/1 ml sau	5 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c./intralingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TAs > 90 mm Hg).
	Adrenalină 1:1000 (EPIPEN,	stick autoinjector 0,3 mg (adulți)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic,

	EPIPEN 300)			injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute, dacă este necesar.
	Adrenalină 1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150)*	stick autoinjector 0,15 mg (copii > 30 kg)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute, dacă este necesar.

* Medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor școlare de medicină dentară, conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 3.764/694/2018.

6.	Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTI D, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)	flacon 100 mg sau fiole 25 mg	10 x 100 mg 40 x 25 mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene.
7.	Prometazină (ROMERGAN)	fiole 50 mg/2 ml	5 buc.	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute.
	sau			
	Loratadină (CLARITINE) sau	cpr. 10 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat în cazul reacțiilor alergice acute.
	Desloratadină (AERIUS) sau	cpr. 5 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat în cazul reacțiilor alergice acute.
	Cetirizină	soluție	1 sticlă	Se administrează

	(ZYRTEC)	10 mg/ml		5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute.
8.	Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)	spray 100 mcg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri inhalate oral în caz de criză de astm bronșic.
9.	Glucoza 5%	flacon 1000 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie.
10.	Diazepam	fiole 10 mg/2 ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m în caz de criză convulsivă.
11.	Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)	Cpr. 10 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat oral ca analgetic.
	sau			Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)
	Cpr. 500 mg	5 buc.	12.	Drotavertină (NO-SPA)
Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 comprimat oral ca analgetic la pacienta însărcinată.	13.	Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN)**
Cpr. 500 mg	5 buc.	Se administrează 2 g oral pentru antibioprofilaxie		sau
Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE)	Cpr. 600 mg	5 buc.		Se administrează 1 comprimat oral pentru antiprofilaxie.

**** Nu se administrează pacienților alergici la peniciline!**

C.Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor;
- balon de resuscitare;
- pipă orafaringiană.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 273 din data de 10 aprilie 2019